

CONGRESO | Kongresua

INNOVACIONES Y DESAFÍOS EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS MAYORES

Berrikuntzak eta erronkak
pertsona nagusien zaintzan

Urriak **23, 24** de octubre

Universidad de Deusto, Bilbao



EL COHETE

Protocolo para la detección precoz de infección del tracto urinario en pacientes con incontinencia

Introducción

Las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) son las más frecuentes en la población geriátrica, con una incidencia de 10-15/10000 personas por día, y representan aproximadamente el 10% en varones y 20% en mujeres mayores de 65 años. La prevalencia de esta enfermedad es considerablemente mayor en la persona mayor, dado que el propio envejecimiento produce una alteración en los mecanismos inmunológicos frente a las infecciones. Esta alta prevalencia causa el 15,5% de las hospitalizaciones y el 6,2% de las muertes atribuidas a enfermedades infecciosas en mayores de 65 años.

Cabe destacar que en pacientes de edad avanzada o con enfermedades neurodegenerativas, endocrinas, cardíacas y/o renales, los síntomas suelen presentarse en forma subclínica (alteración conductual, desde agresividad, delirios y alucinaciones, apatía, inapetencia o somnolencia). Conllevando una mayor dificultad en su diagnóstico.

A su vez, en pacientes incontinentes o con deterioro cognitivo se presenta una dificultad en la recogida de una muestra de orina mediante micción espontánea. En estos casos, se dilata en el tiempo la recogida de la muestra, e incluso se tiene que recurrir al sondaje urinario, con los riesgos y complicaciones que supone (dolor, agitación y riesgo de infección).

Objetivo

- Desarrollo e implementación de un protocolo para la detección precoz de la ITU en pacientes con incontinencia.

Contenidos

- Dar a conocer el protocolo dónde se expone la fiabilidad de diagnóstico de una ITU mediante los resultados obtenidos con la tira reactiva de orina realizada en muestra de orina recogida en un absorbente en pacientes con incontinencia.
- Exponer el procedimiento de la técnica e interpretación de los resultados. Exponer los riesgos y beneficios de ésta técnica

Metodología

- Fase de desarrollo del protocolo: Se realizó una revisión Bibliográfica exhaustiva, en las bases de datos (Pubmed, Cinahl, Scopus, Cochrane), entre febrero y septiembre de 2023. El protocolo se elaboró con la colaboración de un comité de expertos (enfermera de geriatría, enfermera del servicio de Calidad y Médico del departamento de Nefrología) y la aprobación de la Comisión de Enfermedades Infecciosas del hospital.
- Fase de implementación del protocolo: Se realizaron 2 sesiones formativas para llegar a todo el personal de la unidad.

Resultados

Descarte de las ITU de manera precoz y sin intervenciones agresivas como sondajes vesicales.

Se demostró la fiabilidad de los resultados obtenidos mediante la técnica de Tira de reactiva con orina recogida en absorbentes. Los resultados medidos en sensibilidad fueron; en Nitritos del 100%, en Leucocitos del 98,9% y en Hemoglobina del 93,8%.

En una fase posterior se pretende evaluar la efectividad del protocolo teniendo en cuenta el tiempo que se tarda en la detección con y sin implantación del protocolo y el inicio de antibióticos.

Autores

- Menta Rangel, Amaia
- Valencia Valencia, Esther
- Lavilla Roy, Javier
- Cons Mayán, Maria Lourdes
- Garcés Rey, Silvia



Clínica
Universidad
de Navarra

Proyecto de valoración gerontológica en la consulta de Nefrología y Unidad de Hipertensión. Evaluación fragilidad y vulnerabilidad.

Introducción

En la consulta de Nefrología-Hipertensión Arterial aumenta el número de personas mayores, dando la oportunidad de tratar la patología por la cual acuden, y realizar un cribaje. Detectar necesidades a nivel físico, emocional y social, mejorando calidad de vida.

Objetivo

- Mejorar valoración gerontológica
- Impacto de la enfermedad renal crónica
- Detectar fragilidad y vulnerabilidad

Metodología

- FASE 1 Valoración estado subjetivo bienestar (ESB) con valoración (1 a 10) y encuesta en dieta, ejercicio, sueño, autocuidado, seguimiento medicación, actividad diaria, entorno sociofamiliar, estado emocional (1 a 3).
- FASE 2 Aplicación medidas antropométricas (IMC, perímetro extremidad superior dominante relajada-contráida), fuerza prensora.
- FASE 3 Estudio Hipotensión ortostática (PAD diastólica, PAS sistólica) con presión arterial decúbito (DEC), ortostático (O) y ortostático tardío (OT).
- FASE 4 Aplicación escalas. (FRAIL, CLINICAL FRAILTY SCALE, VIG FRAGIL) SPPB, Test levanta-camina (TLYC)
- FASE 5 Localización y seguimiento vulnerabilidad (fragilidad y soledad).

Contenidos

- Se incluyen 506 asistencias. 65 a 74 años (M) 166. 75 a 84 años (MM) 268, más de 85 años 70 (MMM) Control menos 65 años 332 (C).
- ESTADO SUBJETIVO DE BIENESTAR ESB: No existe asociación con edad. Se detectó vulnerabilidad sociofamiliar en 27,7% mayores de 65 años sin ERC, con ERC 29.9%. ($p=0,737$).
- MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS-FUERZA PRENSOR: En personas mayores la edad se asocia con fuerza ($r -0,297$ $p<0,001$). En ERC la edad se asocia mejor con fuerza ($r -0,405$ $p<0,001$), aunque era menor (24,8 EE 0,9 kg EE 1,0 vs 28,3 EE 1,0 $p=0,071$).
- HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA: No observamos diferencias en cambios de presión arterial salvo en pacientes con ERC donde la presión arterial diastólica PAD desciende (PAD DEC a PAD ORT 5,7 vs -2,32 $p<0,001$) y PAD DEC a PAD ORT TARD 6,1 a -1,36 $p=0,003$).
- ESCALAS DE FRAGILIDAD: Se asocia edad con SPPB ($r -0,471$ $p=0,001$) FRAIL ($r=0,419$ $p<0,001$), CLINICAL FRAIL SCALE ($r=0,476$ $p<0,001$) y VIG FRAGIL $r=0,490$ $p=0,003$).

Test LYC $r=0.406$ $p=0.013$. Con ERC se relaciona edad con SPPB ($r -0,470$ $p=0,008$)
FRAIL ($r=0,363$ $p =0,005$), CLINICAL FRAIL SCALE ($r=0,375$ $p=0,004$) y VIG FRAGIL
 $r=0,524$ $p=0,009$). TLYC $r=0.512$ $p=0.006$

- VULNERABILIDAD: Se detectó vulnerabilidad 27,7% sin ERC, con ERC 29.9%. ($p=0,737$).
En ancianos ESB fue peor en entorno sociofamiliar negativo leve-moderado o grave
(6,31 EE0,47, 6,6 EE0,15 vs 7,51 EE0,13, $p=0,002$), y especialmente ERC (5,63 EE0,68,
6,46 EE0,18, vs 7,69 EE0,307, $p=0,025$)

Resultados

Las personas mayores precisan de enfoque integral-gerontológico. La edad se correlaciona con fuerza prensora y fragilidad, especialmente en ERC. La persona mayor con ERC presenta hipotensión ortostática diastólica. Existe vulnerabilidad relevante, ligeramente mayor en ERC que afecta a ESB. La ERC influye en ese enfoque.

Autores

- Lavilla Royo, Francisco Javier
- Polo Trapero, Elisa
- Menta Rangel, Amaia
- Carvajal Reyes, Ana
- Bastida Iñarea, Edurne
- Lasanta Medel, Susana



Clínica
Universidad
de Navarra

Ciclo de charlas: viviendo un envejecimiento con sentido

Introducción

Se ha realizado un ciclo de 4 charlas dentro del marco de un proyecto comunitario de abordaje de la soledad no deseada existente.

Objetivo

- Fomentar la triple función transformadora de la acción comunitaria
 - Mejorar las condiciones de vida
 - Reforzar los vínculos y la cohesión social
 - Potenciar las capacidades de acción individual y colectiva (empoderamiento)
- Prevenir de la soledad no deseada
- Sensibilizar sobre distintos temas relacionados con la salud y el envejecimiento.

Metodología

Este trabajo es una intervención de educación para salud (EPS) con evaluación post-test, utilizando de base metodológica el Ciclo de Acción Comunitaria. Para la evaluación se ha utilizado un método mixto de evaluación anónima post-test: cuantitativa y cualitativa con grupo focal.

El grupo motor de este proyecto ha estado compuesto por un equipo interdisciplinar formado por un fisioterapeuta, una psicóloga y una enfermera, los cuales han trabajado de forma voluntaria y con recursos mínimos.

Contenidos

Se han realizado 4 charlas de 90 minutos sobre los siguientes temas: alimentación activa, soledad, envejecimiento activo y ética de los cuidados.

Resultados

En los talleres han participado un total de 123 personas (96% mujeres / 4% hombres) con una edad media de 75 ± 8 años. Han acudido personas que viven en sus casas y forman parte del proyecto comunitario y personas que viven en una residencia del municipio.

La encuesta post-taller ha reflejado una valoración muy positiva de los contenidos y de los/las ponentes, con puntuaciones superiores a 9/10. El 100% volverían a participar y se lo recomendarían a otras personas como amistades, familia y profesionales.

De la evaluación cualitativa se destaca:

- Las participantes refieren un fuerte sentimiento de pertenencia al proyecto comunitario, sintiéndose parte de su motor desde su construcción. Se pone en valor la importancia del lugar como espacio de encuentro.
- Más allá del aprendizaje, las charlas les ha permitido conocerse e interactuar entre ellas.
- Las personas de la residencia subrayan la importancia de sentirse importantes como parte de la comunidad y poder salir del centro para “hacer algo diferente”, “algo de verdaderos adultos” y relacionarse con otras mayores como ellas, aunque vivan en sus casas. Refieren haber encontrado un espacio de participación y pertenencia a la sociedad.
- Se ha roto un estereotipo de que las personas en situación de institucionalización ya sólo pueden esperar de la vida ser cuidadas. Varias personas comentan la “sorpresa por las ganas de aprender y participar de las personas de la residencia”.
- Se ha solicitado que este ciclo de charlas continúe como actividad permanente del proyecto comunitario.
- Las participantes que acudieron de forma puntual a alguna de las charlas mostraron interés en participar en el proyecto comunitario.

Autores

- Trueba de la Horra, Paula
- Perez Rebollar, Soraya
- Garcia Rebollo, Xabier

Generando conocimiento sobre envejecimiento y autismo en APNABI

Introducción

La investigación sobre el TEA en las últimas décadas ha estado muy centrada en cuestiones como la detección y diagnóstico, atención temprana y ámbito educativo, entre otros aspectos, prestando poca atención a etapas de la vida más avanzadas. No obstante, la proporción de personas con diagnóstico de TEA que alcanza la edad adulta y senectud supone un número muy considerable en relación a otros trastornos del desarrollo como el síndrome de Down o la parálisis cerebral, y no puede ser ignorado. La esperanza de vida de la población con discapacidad intelectual en general ha aumentado, también lo ha hecho en el caso de los TEA, existiendo no obstante un menor número de estudios sobre el proceso de envejecimiento en este colectivo.

Objetivo

- Generar conocimiento y experiencia en la identificación de lo que son procesos de envejecimiento “normales” y cuales son procesos de envejecimiento prematuros.
- Estudiar el efecto de las diferentes modalidades de empleo en las personas con TEA y cómo afecta el envejecimiento a nivel laboral en este colectivo.

Contenidos

Se realiza un diagnóstico inicial de situación sobre el envejecimiento en la entidad 2018. Se constata la necesidad de crear una herramienta interna objetiva que nos permita tener un lenguaje común y unos criterios generales a todo el área adulta.

En 2019 se pone en marcha el programa “ActivaTE A la vida saludable”, con alcance inicial a más de 200 personas.

En 2020 se crea la herramienta interna. Con los resultados de la construcción y la primera pasación de la herramienta, se edita un estudio relacionado con los indicadores de deterioro prematuro. En 2022 realizamos la 1º pasación sistemática de la herramienta interna y desde entonces anualmente.

En 2023 se crea una herramienta similar para el área de empleo, participan 124 personas. Se realiza un estudio del proceso.

Diseñamos un servicio específico de Apoyo a los procesos de envejecimiento en el área laboral de la entidad.

Metodología

Realizamos un diagnóstico inicial, 2018, que nos da el punto de partida de la entidad y nos dice las necesidades detectadas. A partir de ahí, desplegamos acciones del programa.

Construimos las herramientas internas en base a indicadores basados en bibliografía específica y de la observación diaria de los profesionales de atención directa.

Resultados

- 285 personas han sido valoradas a lo largo de todos estos años, monitorización de sus procesos de envejecimiento.
- Hemos identificado un colectivo claro de personas vulnerables, con un perfil de predisposición claro a sufrir procesos de envejecimiento y deterioro prematuro.
- Se han realizado adaptaciones en 49 Planes Personales por la herramienta.
- Realizamos una formación al año sobre envejecimiento, discapacidad intelectual y autismo.
- En el último año se ha ampliado el alcance del proyecto y lo hemos llevado al área de Empleo, otro campo apenas explorado.

Autores

- Gómez García, Javier



Asociación entre la significatividad de las actividades con parámetros funcionales, físicos, cognitivos, afectivos, nutricionales, calidad de vida y fragilidad en personas que viven en residencias

Introducción

Las actividades significativas son aquellas actividades físicas, sociales y de ocio que se adecúan a las preferencias de las personas facilitando su participación. Las políticas en el cuidado de las personas que viven en residencias están comenzando a priorizar la promoción de las citadas actividades, con el objetivo de mejorar y/o mantener la capacidad funcional. Sin embargo, pocos estudios han analizado la relación entre la significatividad de las actividades de esta población y parámetros funcionales, físicos, mentales, nutricionales, de calidad de vida y de fragilidad.

Objetivo

Analizar la relación entre la implicación en actividades significativas con parámetros funcionales, físicos, cognitivos, afectivos, nutricionales, calidad de vida y fragilidad en personas que viven en residencias.

Metodología

Se trata de un análisis transversal en el que se han analizado los datos del inicio de un programa para mejorar la funcionalidad mediante actividades significativas. Se realizó una valoración integral evaluando el estado funcional (Barthel, Katz y Lawton), capacidad física (*Short physical performance battery*, SPPB, *Timed up & go test*, *handgrip* y *functional reach test*), capacidad cognitiva (*Montreal Cognitive Assessment*, MoCA), estado afectivo (*Geriatric Depression Scale-15*), estado nutricional (*Mini Nutritional Assessment-Short Form*), calidad de vida (EuroQol) y fragilidad (Fried y Frail-NH). La implicación en actividades significativas se evaluó mediante la escala propuesta por Fernández Solano y cols. Las asociaciones entre parámetros se analizaron mediante correlaciones de Pearson para las variables paramétricas y de Spearman para las variables no paramétricas, con significancia en $p < 0,05$.

Resultados

Participaron 75 personas de 14 residencias de Bizkaia, con una edad media de 79,24 años y un 56% fueron mujeres. Una mayor implicación en actividades significativas se asoció de manera significativa con una mayor puntuación de Barthel y Katz ($p < 0,01$), SPPB ($p < 0,01$), *Timed up & go test* ($p < 0,05$) y *functional reach test* ($p < 0,05$). Sin embargo, una mayor implicación en las actividades significativas se asoció de manera significativa con menores niveles de depresión ($p < 0,01$), y fragilidad según las escalas de Fried y Frail-NH ($p < 0,01$). No se observó asociación significativa entre la significatividad de las actividades y la capacidad cognitiva, estado nutricional y calidad de vida ($p > 0,05$) (Tabla 1 y Tabla 2).

Tabla 1. Correlaciones entre la implicación en actividades significativas con parámetros funcionales y físicos.

	Barthel	Katz	Lawton	SPPB total	TUG	HG dominante	HG no dominante	FRT
EMAS	0,343**	0,354**	0,159	0,370**	-0,318*	0,206	0,144	0,280*

*p < 0,05; **p < 0,01. **Abreviaturas:** FRT, Functional reach test; SPPB, Short physical performance battery; TUG, Timed up and go test.

Tabla 2. Correlaciones entre la implicación en actividades significativas con parámetros cognitivos, afectivos, nutricionales, calidad de vida y fragilidad.

	MoCA	GDS-15	MNA-SF	EQ-INDEX	EQ-VAS	FRIED	FRAIL-NH
EMAS	0,178	-0,284*	0,046	-0,007	0,127	-0,385**	-0,375**

*p < 0,05; **p < 0,01. **Abreviaturas:** EMAS, Escala de implicación en actividades significativas; FAST, Functional assessment staging; GDS-15, Geriatric depression scale; MNA-SF, Mini nutritional assessment short form; MOCA, Montreal cognitive assessment.

Conclusiones

Los resultados demuestran que una mayor significatividad en las actividades se asocia con una mejor capacidad funcional y física, así como con menor depresión y fragilidad. Por lo tanto, promover las actividades significativas en residencias podría ser una estrategia clave para mejorar los citados parámetros en personas que viven en residencias. Sin embargo, con estos resultados no se puede establecer causalidad, por lo que se debe continuar con estudios de intervención.

Autores

- Urquiza, Miriam
- Martin, Andrea
- Zurbanobeaskoetxea, Lourdes
- Aza, Juana
- Rodriguez Larrad, Ana

Impacto de la práctica de la danza en el mantenimiento del equilibrio, la estabilidad del estado de ánimo y la calidad de vida en las personas mayores

Introducción

Con el apoyo de la ARS Nouvelle-Aquitaine, el Centro de Recursos Locales “Orekatua” de la residencia de ancianos Egoa en Bassussary y el Malandain Ballet Biarritz se desarrolló un proyecto de sensibilización sobre el arte coreográfico para un grupo de nueve mujeres mayores que viven en su domicilio, entre octubre de 2022 y marzo de 2023, con una duración total de cincuenta y dos horas de intervención.

Durante seis meses de proyecto Ione Miren Aguirre bailarina y coreógrafa responsable del proyecto de sensibilización de la compañía de Ballet, realizó la adaptación de piezas del repertorio de Thierry Malandain a las capacidades de movimiento del grupo; el proyecto igualmente contó con el acompañamiento de la danzaterapeuta Alba Buitrago Lassalle.

Entre octubre y principios de marzo, los talleres coreográficos tuvieron lugar una vez por semana, luego la semana del lunes 13 de marzo, los participantes ingresaron a una residencia creativa para trabajar en la coreografía, el vestuario y la puesta en escena de su presentación pública que tendrá lugar el sábado 18 de marzo de 2023 en el Studio Gamaritz del Théâtre de la Gare du Midi en Biarritz, frente a un centenar de espectadores.

Objetivo

- Evaluar el riesgo de caídas, los trastornos del estado de ánimo y la calidad de vida en personas mayores que viven en casa.
- Combinar el uso de la escritura y el movimiento para analizar el impacto del proceso creativo y artístico en procesos de autorreflexión, autopercepción e integración de la experiencia.

Contenidos


- **Población:** 9 mujeres adultas, la media de edad del grupo 78 años (dos mujeres mayores de 80 años).
- **Duración del Proyecto:** 6 meses para un total de 52 horas de intervención en movimiento.

Metodología

- Mixta. Método cuantitativo y cualitativo.
- Para obtener datos de carácter cuantitativo Miren Fuertes Arrizabalaga gestora del proyecto y proponente del estudio de impacto, utilizo como herramientas el Test de Tinetti (evaluación del riesgo de caídas en el anciano), el GDS-15 (detección de depresión en el adulto mayor, Escala de Depresión Geriátrica, versión corta) y el SF-36 Health Status Questionnaire (MOS SF-36, Medical Outcome Study, versión corta, 36 ítems). Las pruebas fueron aplicadas antes del inicio y una vez finalizada la experiencia, teniendo en cuenta la duración del proyecto no se consideró pertinente la realización de una medición interfase.
- Con el fin de obtener datos de carácter cualitativo se utilizó un “Diario de la experiencia” que las participantes diligenciaron de manera anónima al final de cada sesión. La sistematización de los datos se realizó en una segunda transcripción que resultara compatible con el software de ATLAS. Ti, el cual contiene un conjunto de herramientas para el análisis cualitativo de datos textuales, a través de él se pudo organizar, reagrupar y gestionar el material de manera creativa y, al mismo tiempo, metódica pues permite mantenerse centrado en el propio material de estudio y generar categorías de interpretación específicas al fenómeno en cuestión.

Resultados

- **Resultados Test de Tinetti.** Tras 27 semanas de trabajo, los resultados muestran una evolución positiva de 5 puntos. Al principio del proyecto, 3 de cada 7 mujeres tenían un riesgo muy alto de caídas (diagnosticadas con enfermedad de Parkinson y sarcopenia). Los otros 4 participantes, al inicio del proyecto, tenían un alto riesgo de caída. Las pruebas realizadas después del proyecto muestran resultados positivos en la prevención de caídas después de la práctica regular de baile.



≤20 puntos: Riesgo muy alto de caída

20-23 puntos: Riesgo alto de caída

24-27 puntos: Bajo riesgo de caída, búsqueda de una causa como la longitud desigual de las extremidades

28: Normal

- **Resultados Escala GDS-15.** Los resultados de la Escala de Depresión Geriátrica (versión corta) son aún más significativos con una evolución en la disminución de los puntos que tenían una alta probabilidad de depresión al convertirse en una puntuación considerada normal.



- **Test SF-36.** Después de analizar las respuestas, encontramos una mejora significativa en el sentimiento hacia los ítems relacionados con el funcionamiento físico, las limitaciones de rol debido a la salud física, el bienestar emocional y las limitaciones de rol debido a problemas emocionales. También, un mantenimiento de la puntuación en los ítems de dolor, energía/fatiga, funcionamiento social y su consideración de la salud en general.
- **Fenomenología de la Experiencia artística.** Para obtener datos factibles de cualificación propusimos a las participantes del proyecto escribir en un diario sus reflexiones al final de cada sesión, con el fin de abrir un camino hacia la interiorización de la experiencia para la propia voz. La sistematización de los textos enfatiza las formas emergentes de comunicar la experiencia encarnada, resalta el elevado uso de metáforas e imágenes simbólicas, así como un lenguaje poético.

Conclusiones

Los enfoques artísticos y terapéuticos no son lo mismo, pero, puestos al servicio de este estudio, se han convertido en complementarios. La emoción estética puede estar presente en todas partes, ya sea una cuestión de creación, interpretación o contemplación; el arte hace un trabajo de movilización de procesos que iluminan y complementan datos susceptibles de analizar a la luz de la psicología del desarrollo.

Es posible que al escribir reflexiones sobre la experiencia a través de un lenguaje compuesto por estructuras conceptuales conscientes e inconscientes, las palabras se conviertan en el medio de "localizar", adaptar, atrapar, asimilar, incorporar o, en última instancia, gestionar la novedad y el impacto de la experiencia.

Con el fin de promover el proyecto, el Malandain Ballet Biarritz ha producido un vídeo documental y un reportaje fotográfico que sigue las diferentes etapas del proyecto: desde los talleres coreográficos hasta la residencia de creación, pasando por la actuación pública. Estos materiales de comunicación, accesibles en línea, se difundieron en las redes del Malandain Ballet Biarritz y se enviaron a los participantes y promotores del proyecto.

Autores

- Fuertes Arrizabalaga, Miren
- Buitrago Lassalle, Alba

Valoración geriátrica de ingreso temporal en un centro residencial

Introducción

Las características y necesidades que presentan las personas mayores hacen indispensable el diseño de un plan individualizado preventivo, terapéutico y rehabilitador. Con el objetivo de alcanzar un mayor nivel de autonomía y calidad de vida.

Hay que destacar que los aspectos intrínsecos del envejecimiento fisiológico, los síntomas atípicos que presentan las enfermedades en las personas mayores, las necesidades, disfunciones y dependencias reversibles no diagnosticadas, hacen necesaria la aplicación de un sistema especial de valoración.

La valoración geriátrica integral es un proceso diagnóstico dinámico y estructurado que permite detectar y cuantificar los problemas, necesidades y capacidades del anciano en las esferas clínica, funcional, mental y social para elaborar, basada en ellos, una estrategia interdisciplinar de intervención, tratamiento y seguimiento con el fin de optimizar los recursos y de lograr el mayor grado de independencia y en definitiva, calidad de vida.

Por todo ello existe la necesidad de realizar una valoración geriátrica integral tanto a las personas mayores que vayan a ingresar de manera permanente en un Centro Residencial como a los que van a ingresar durante una corta estancia.

Objetivo

- Detectar y prevenir el deterioro funcional en el anciano frágil a corto plazo, mejorando la autonomía garantizando la calidad y seguridad asistencial.

Contenidos

- Descripción y análisis de los componentes de la valoración geriátrica integral de corta estancia (clínica, mental, social y funcional).
- Clasificación del paciente anciano: Anciano frágil, enfermo y geriátrico.
- Beneficios de la valoración geriátrica integral en geriatría.

Metodología

Fase de desarrollo de la Valoración geriátrica temporal: Se realizó una revisión Bibliográfica exhaustiva, en las bases de datos (Pubmed, Cinahl, Scopus), entre Enero y Diciembre de 2023. El procedimiento se elaboró con la colaboración de un comité de expertos (enfermera de geriatría, Supervisora de la Unidad y Médico de la Unidad).

Resultados

- La detección temprana de la fragilidad, mediante la valoración geriátrica integral permite diseñar estrategias de intervención, previene y retrasa el deterioro funcional y las complicaciones asociadas un 25-30%.
- La valoración geriátrica integral empodera a los profesionales para la toma de decisiones en la planificación de los cuidados, siendo esencial en la atención de los ancianos frágiles por su beneficio clínico y a su vez mejorando la eficiencia del sistema socio-sanitario.
- Con esta herramienta se mejora la calidad en la atención geriátrica en un 20-30% y se obtienen mejores resultados clínicos. Además, al adoptar un enfoque multidisciplinar, se mejora la atención y el manejo de los adultos mayores frágiles, previniendo el deterioro de la salud de los ancianos en un 20-30%.

Autores

- Garcés Rey, Silvia
- Cons Mayán, Maria Lourdes
- Menta Rangel, Amaia
- Valencia Valencia, Esther
- Lavilla Royo, Javier



Clínica
Universidad
de Navarra

Prescripción de ejercicio físico a personas adultas con enfermedades crónicas

Introducción

Actualmente estamos observando un incremento de personas mayores con enfermedades crónicas y dependencia. Por ello, uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es el de fomentar hábitos de vida que favorezcan un envejecimiento saludable. Una estrategia para lograrlo es integrar los programas de ejercicio físico como parte fundamental de la atención a las personas mayores, mediante una prescripción individualizada que facilite una intervención no farmacológica.

Objetivo

Analizar el efecto de una intervención de prescripción de ejercicio físico en un grupo de personas adultas con enfermedades crónicas en el Centro de Salud de Ortuella: Programa Zugar Pentsatuz - Pensando en ti.


Metodología

Estudio experimental de seguimiento longitudinal, con un análisis de variables cuantitativas pre y post intervención. La intervención consistió en sesiones presenciales de 60 minutos de ejercicio físico, dos veces por semana durante seis meses. Criterios de inclusión: personas mayores de 50 años, sedentarias, con patologías crónicas estables (hipertensión, obesidad, diabetes y dolor de espalda). Variables: Parámetros físicos de la salud (índice de masa corporal, presión arterial sistólica y diastólica), parámetros bioquímicos (hemoglobina glicosilada, glucosa, colesterol total, HDL-colesterol, triglicéridos), y parámetros de condición física (batería Senior Fitness Test: equilibrio, fuerza en extremidades inferiores, fuerza en extremidades superiores, agilidad y resistencia). Todas las personas firmaron el consentimiento informado. El análisis estadístico se realizó con el programa IBM SPSS Statistics versión: 28.

Resultados y discusión

La muestra final estuvo compuesta por 24 participantes (6 hombres/18 mujeres), edad media $64,8 \pm 7,12$ años que realizaron una intervención de ejercicio físico guiado durante 6 meses. De todos los parámetros estudiados, 7 de ellos obtuvieron mejoras significativas tras la intervención: glucosa, colesterol total, triglicéridos, fuerza en extremidades superiores (derecha e izquierda), agilidad y resistencia.

Los hallazgos coinciden con la evidencia científica que valida y promueve la modificación del estilo de vida a través del ejercicio físico como terapia de primera línea para manejar enfermedades crónicas, ganar fuerza muscular y mejorar la condición física, lo que también podría repercutir a otros niveles, mejorando finalmente la calidad de vida.



Conclusión

La intervención realizada tiene un efecto beneficioso y significativo, tanto en parámetros bioquímicos como de condición física. Aunque se necesita más investigación sobre este programa, se alienta a una mayor prescripción de programas de ejercicio físico en la población y comunidades, especialmente cuando aparecen situaciones de cronicidad y sedentarismo.

Autores

- Politis Mella, Leslie
- Mandiola López, Patricia
- Pardo Galarza, Ana
- Fraile Bermúdez, Ana Belén

Trabajadoras del hogar y de los cuidados de personas mayores con dependencia: caracterización sociodemográfica y psicológica

Introducción

Tradicionalmente, el cuidado de personas mayores con dependencia se ha otorgado por parte de las mujeres de la familia. Sin embargo, la actual crisis de los cuidados ha favorecido la mercantilización y la externalización de estas tareas en trabajadoras del hogar y de los cuidados. Estas trabajadoras son generalmente mujeres migrantes que, menudo, realizan estas tareas en el domicilio.

Objetivo

Realizar una caracterización sociodemográfica y psicológica de las cuidadoras migrantes que trabajan en el domicilio en el sector de los cuidados, y analizar las diferencias en las variables psicológicas y laborales en función de la edad, las horas de trabajo y el tipo de dependencia de la persona cuidada.


Metodología

Participaron 247 mujeres migrantes, principalmente latinoamericanas (98.7%), solteras (62.3%) y con hijos/as a cargo (76.5%). Cumplimentaron un protocolo de evaluación que incluía variables sociodemográficas y psicológicas. Concretamente, para la evaluación del burnout se utilizó el *Maslach Burnout Inventory* (MBI) que mide las dimensiones cansancio emocional, despersonalización y realización personal. La calidad de vida relacionada con la salud física y mental se midió con el Cuestionario de salud SF-12. Finalmente, el bienestar subjetivo se evaluó con la *Escala de afecto positivo y negativo* (PANAS) y con la *Escala de satisfacción con la vida* (SWLS).

Resultados


Se hallaron diferencias significativas en la edad, siendo las cuidadoras más jóvenes las que presentan mayores niveles de burnout, peor salud mental y calidad de vida relacionada con la salud mental. Además, es más frecuente que no tengan un contrato de trabajo (42.5%).

Figura 1. Diferencias en función de la edad




También se encontró que las que trabajan más horas presentan mayor cansancio emocional y menor CVRS física.

Figura 2. Diferencias en función de las horas de trabajo semanales



Por último, se encontró que las que cuidan a personas con algún tipo de dependencia (física y/o cognitiva) presentan mayor cansancio emocional que aquellas que cuidan a una persona que requiere mínima ayuda. Al tiempo que las que cuidan de personas con dependencia física presentan una peor calidad de vida relacionada con la salud física y mayor afecto negativo.

Figura 3. Diferencias en función del tipo de dependencia de la persona cuidada



Conclusión

Las trabajadoras del hogar y de los cuidados más jóvenes, que trabajan más horas semanales y que cuidan a personas con algún tipo de dependencia se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que aquellas que tienen más de 40 años, trabajan menos de 40 horas y cuidan de personas que requieren un apoyo mínimo.

Autores

- García Pena, Fátima María
- Etxeberria Arritxabal, Igone
- Gorostiaga Manterola, Arantxa

Check list para la prevención de caídas en personas mayores institucionalizadas en el entorno de su habitación

Introducción

Las caídas son uno de los grandes síndromes geriátricos más prevalentes en las personas mayores (1). Este suceso está considerado como un evento adverso ya que puede ocasionar graves consecuencias físicas y psicológicas afectando directamente a su calidad de vida y generando elevados costes sanitarios. En los centros geriátricos y sociosanitarios la seguridad es una prioridad, más aún cuando los usuarios se encuentran en situaciones de fragilidad y dependencia (2). Además, es primordial mantener un equilibrio entre proteger la integridad de las personas mayores y garantizar sus derechos individuales y su autonomía (3,4). Un lugar donde ocurren un alto porcentaje de caídas en personas institucionalizadas es el dormitorio (5) ya que, al tratarse de un espacio privado, se encuentran fuera del campo de visión de los profesionales. Intervenir en este entorno podría reducir la incidencia de caídas y mitigar sus repercusiones negativas, de otro modo puede derivar en la utilización de sujeciones.

Objetivo

Elaborar una herramienta sencilla que facilite la prevención de las caídas o la minimización de la gravedad de sus consecuencias, orientada a personas mayores institucionalizadas en el entorno de su habitación.

Metodología

Se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed y Google académico para identificar los factores de riesgo extrínsecos / modificables de las caídas de las personas mayores en los centros de cuidados de larga duración y sociosanitarios en el entorno privado. Una vez identificados, se buscaron las medidas preventivas para evitarlos.

Resultados y contenido

Con toda la información recabada, junto con la experiencia clínica en cuidados de larga duración, se desarrolló un checklist o lista de verificación que diese cumplimiento al objetivo y que permita la anticipación al riesgo de las mismas.

<h2 style="text-align: center;">LIVERAME</h2> <p style="text-align: center;">Lista De Verificación Residencial para el Adulto Mayor En Cama</p>					
ALTURA de la cama	BARANDILLAS laterales	CALZADO	DISPOSITIVOS auxiliares	ELEMENTOS de ayuda técnica	FRENOS
Altura adecuada a las necesidades o características del usuario. media altura, contra la pared, a ras de suelo	Si precisa y/o preferencias del usuario	Calzado adecuado y accesible	Funcionamiento correcto y a su alcance (gafas, luz, timbre, mando de cama, dispositivo de eliminación vesical)	Si precisa ponerlos a su alcance (bastón, triángulo de incorporación, S.R. andador)	Cama, silla de ruedas, Mesilla... FARMACOS si precisa
A	B	C	D	E	F

**Esta herramienta se debe adaptar a las necesidades, preferencias o al estado del usuario.*



- ✓ *Juan, 84 años, con diagnóstico de deterioro cognitivo moderado, precisa gafas y bastón para caminar, nos aseguraremos que estén accesibles. Si necesita orinar por la noche, se colocará el "conejo" en la mesilla y el timbre para solicitar nuestra presencia.*
- ✓ *María, 78 años, sufre hipotensión ortostática al levantarse y un historial de caídas previas por deambulación inestable. Debido a esto, presenta el síndrome post-caída o miedo a caer. Además se ha evidenciado una incontinencia urinaria. En este caso se asegurará la cama a ras de suelo, alfombra anticaídas, absorbente nocturno y accesibilidad del timbre.*

**En todos los casos es importante asegurar los frenos, colocar el timbre de llamada al alcance y encender la luz de presencia durante la noche.*

Conclusiones

Esta herramienta de verificación del entorno (dormitorio) es sencilla, dinámica, atractiva, personalizable y de utilización universal; un checklist breve y funcional que permite la prevención de caídas o la minimización de la gravedad de sus consecuencias en entornos asistidos. Permite añadir parámetros (colchón antiescaras operativo, alfombras anticaídas...), incorporarla al Plan de Atención Integral Centrada en la Persona y debe comprobarse en cada ronda de seguridad.

Autores

- García Corbalan, Teresa
- Barbero García, Nerea
- Fraile Bermúdez, Ana Belén

Mindfulness para estar presente en la vida

Introducción

Tras observar que muchos pacientes paliativos y sus familiares, tienen miedo y tendencia a anticipar en negativo, anclándose a veces en la fecha de muerte. Dejando así de disfrutar del día a día, de los momentos con las familias o amigos. Hemos creado un programa de diez días que combina el mindfulness y las bases del counseling, para realizar en el domicilio, con el fin de ofrecer un apoyo extra a las familias que acompañamos al final de vida y a los duelos.

Objetivo

El programa se realiza con tres objetivos:

- Reducir el nivel de ansiedad.
- Dejar de anticipar situaciones en negativo.
- Conectar con la vida, a través del amor a uno mismo del amor al resto, de la gratitud y del disfrute de cada momento del día a día.

Metodología

- Se ha creado un programa de diez días, en formato PDF para poder enviarlo a través del móvil.
- Cada día tiene planteada una pequeña teoría para reflexionar, una meditación relacionada con el tema concreto a tratar y un ejercicio de mindfulness a incluir en las actividades de la vida diaria.
- El programa incluye para el primer y el último día, la recogida de datos, a través de la escala Goldberg de ansiedad, una pregunta tipo Likert sobre la tendencia a anticipar y una pregunta abierta al final del mismo para valorarlo de forma cualitativa la aportación del mismo.
- De momento la muestra es de 30, 5 pacientes y 27 familiares, con una edad media de 42,75 años.

Resultados

- En la escala de ansiedad, los pacientes han obtenido 3 puntos de mejora y los familiares, 2,8.
- En la escala de Likert de cinco puntos para la pregunta planteada sobre la tendencia a anticipar, todos los pacientes han mejorado por lo menos un nivel.
- Y a la pregunta abierta sobre lo que les ha aportado el programa, se recogen respuestas de gratitud, y mejoras concretas, como, por ejemplo, pensar menos en la muerte

ZAHARTZAROA

Mindfulness para estar presente en la vida

GUIOMAR AGOTE

Lori Thompson, Nerea Manterola, Carlos Rueda, Xabier Alvarez, Edgar Chamorro

OBJETIVOS

Reducir el nivel de ansiedad.

Dejar de anticipar situaciones en negativo.

Conectar con la vida, a través del amor a uno mismo del amor al resto, de la gratitud y del disfrute de cada momento del día a día.

METODOLOGÍA

Tras observar que muchos pacientes paliativos y sus familiares, tienen miedo y tendencia a anticipar en negativo, anclándose a veces en la fecha de muerte. Dejando así de disfrutar del día a día, de los momentos con las familias o amigos. Hemos creado un programa de diez días que combina el mindfulness y las bases del counseling, para realizar en el domicilio, con el fin de ofrecer un apoyo extra a las familias que acompañamos al final de vida y a los duelos.

Se ha creado un programa de diez días, en formato PDF para poder enviarlo a través del móvil, que combina, reflexiones, meditaciones y ejercicios creados por el equipo, para aprender a meditar de forma sencilla y la presencia en el día a día, aprovechando para trabajar temas importantes al final de la vida, como la autoestima, el perdón, la gratitud y el amor.



RESULTADOS

Total de la muestra: 31

De los cuales 5 son pacientes y 26 familiares.


RESULTADOS CUANTITATIVOS:

Pacientes han mejorado 3 puntos en la escala Goldberg.

Familiares han mejorado 2, 69 en la escala Goldberg.

La tendencia a anticipar ha mejorado en todos una media de un punto en escala Lickert.

RESULTADOS CUALITATIVOS:



matia

AtenciónIntegral

Fundación "la Caixa"

Autores

- Agote Olave, Guiomar

Fundación "la Caixa"

AtenciónIntegral

matia

Aceptabilidad de un programa de ejercicio físico multicomponente para reducir la fragilidad en personas mayores que son usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio

Introducción

El envejecimiento de la población y el deseo de las personas mayores de vivir en sus domicilios el mayor tiempo posible ha aumentado la demanda de los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD). Las personas usuarias del SAD presentan altas tasas de fragilidad, un síndrome geriátrico caracterizado por la disminución de las reservas y funciones fisiológicas, lo que aumenta el riesgo de eventos adversos. Los programas de ejercicio físico multicomponente (PEFM) son efectivos para abordar la fragilidad. Sin embargo, la participación de personas mayores, especialmente las más vulnerables, suele ser baja debido a dificultades para desplazarse y adaptarse a nuevas rutinas. Por ello, es interesante explorar alternativas atractivas para colectivos de adultos mayores vulnerables.

Objetivo

Evaluar la aceptabilidad de un PEFM combinado (grupal presencial e individual en el domicilio) en personas usuarias del SAD para reducir la fragilidad.


Metodología

Se desarrolló un estudio piloto cuasiexperimental con personas de más de 60 años usuarias del SAD. Las personas participantes fueron asignadas en base a su voluntad a un grupo de intervención (GI) o un grupo control (GC). Todas recibieron recomendaciones individualizadas para mantenerse activas. El GI participó en un PEFM a intensidad moderada durante 16 semanas. Cada semana se realizaba una sesión grupal presencial guiada por una fisioterapeuta en un local cercano a los hogares de las personas, donde se trabajaba la fuerza al 50-70% del 1RM, el equilibrio y la flexibilidad. Adicionalmente, se pautaban realizar dos sesiones semanales de manera individual en el domicilio, basadas en el programa Vivifrail.

Se evaluó la aceptabilidad del PEFM a través de la asistencia, el cumplimiento y la satisfacción con el programa. Se midió la fragilidad mediante la Escala de Fried antes de comenzar la intervención y nada más finalizarla. La comparación estadística se realizó mediante un ANCOVA que evaluó la interacción grupo x tiempo, utilizando el valor inicial de fragilidad como covariable.

Resultados

Un total de 44 personas participaron en el estudio. La asistencia fue del 83 % en la modalidad grupal, siendo las razones de falta de asistencia problemas de salud o compromisos. El cumplimiento con la programación del PEFM fue del 73 % para la modalidad grupal presencial y del 71 % para la modalidad individual en el domicilio. Las personas participantes indicaron una satisfacción media de 9 puntos sobre 10 y la mayoría declararon que disfrutaron y se sintieron orgullosos de haber participado en las sesiones. La fragilidad se redujo significativamente en el GI en comparación con el GC ($p < 0,05$), tal y como se muestra en el gráfico.



Conclusión

El programa evaluado de ejercicio físico es aceptable y podría ser efectivo para reducir la fragilidad en personas mayores que reciben atención domiciliaria.

Autores

- Ruiz Fernández, Aida
- Goirigolzarri Garaizar, Andere
- Ugalde Aranzabal, Nora
- Espin Elorza, Ander
- Irazusta Astiazaran, Jon

DetECCIÓN DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO EN PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA PARA UN CUIDADO INTEGRAL

Introducción

Desde comienzos del S.XXI, el porcentaje de población de más de 65 años en Euskadi no ha dejado de aumentar. Los escenarios demográficos proyectados por Eustat a 20 y 40 años vista, intensifican ese crecimiento, que será especialmente notorio durante los próximos 20 años.

La realidad social del envejecimiento de la población, debido al aumento de la esperanza de vida, es un fenómeno en el que se encuentran las personas con discapacidad, y entre ellas, las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En nuestro contexto, diferentes planes contemplan la atención al proceso del envejecimiento como el Plan de Atención a las personas Mayores (PAM) elaborado por Osakidetza o el Marco Estratégico 2021-2024 del Departamento de Salud del Gobierno Vasco en los que reconocen la necesidad de un nuevo modelo integral de atención sociosanitaria enfocado en la fragilidad de la persona mayor. Envejecer en buenas condiciones es un gran logro social y multicausal que constituye un reto en la política de atención sociosanitaria en Euskadi. Sin embargo, estos documentos no reflejan las particularidades de las personas con discapacidad en esta etapa de la vida.

Asimismo, la literatura pone en valor la inexistencia de herramientas adecuadas para una valoración integral que contribuye a predecir, en función de las necesidades identificadas, la atención que precisan las personas mayores con TEA como consecuencia del proceso del envejecimiento.

Objetivo

Diseñar una herramienta de detección en el proceso de envejecimiento en personas con TEA.

Metodología

En el transcurso de este proyecto se llevará a cabo una revisión bibliográfica, un diagnóstico sociodemográfico y sanitario de la población de referencia y se analizarán los principales indicadores para el diseño de una herramienta que identifique el proceso de envejecimiento en personas con TEA.

Resultados

Se realizó una revisión sistemática para identificar los dominios de las principales escalas utilizadas en la detección del envejecimiento en personas con TEA, al objeto de conocer los aspectos más relevantes para el desarrollo de un plan de cuidados personalizado. Esta búsqueda se efectuó entre enero y septiembre de 2024 en Pubmed, PsycInfo, Scopus, Web of Science, NICE y Cochrane.

Se identificaron los siguientes dominios que forman parte de la Valoración Geriátrica Integral: dominio funcional, mental, biomédico, social, fragilidad, riesgo de caídas y calidad de vida.

Asimismo, se ha llevado a cabo una recopilación de datos sociodemográficos y sanitarios de la población diana.

En la actualidad, estamos llevando a cabo un estudio cualitativo para complementar la información obtenida en la revisión y así diseñar una herramienta multidimensional para la detección del proceso de envejecimiento en personas con TEA.

Autores

- Lacalle Prieto, Jaione
- Pereda Goikoetxea, Beatriz
- Ugartemendia Yerobi, Mainer
- Trespaderne Beracieto, Maria Isabel
- Lopetegui Labayen, Amaia
- Arrizabalaga Otaegui, Asier

Impacto de un programa de atención psicosocial a personas con demencia muy avanzada y personas cuidadoras en residencias

Introducción

Desde 2023 se desarrolla en tres residencias un programa de apoyo psicosocial a personas con demencia muy avanzada y cuidadoras/es, en el marco de la atención paliativa y el cuidado centrado en la persona. La constatación de la alta prevalencia de demencia muy avanzada lleva a la implementación de un programa alternativo adaptado a esta realidad y a las necesidades de familias y profesionales.

El proyecto se sustenta en el paradigma de la Atención Integral Centrada en la Persona, la aproximación a las necesidades psicosociales de las personas (Kitwood) y modelos europeos de referencia en Cuidados Paliativos. De esta manera, la mirada se dirige a la persona detrás de la demencia y su unicidad, la promoción de las necesidades de confort, apego, identidad, ocupación e inclusión, y la atención a la fragilidad al final de la vida en residencias.

Atender las necesidades psicosociales de las personas implica considerar el entorno social, de manera que las familias, amistades y profesionales de atención directa constituyen en sí mismo objeto de atención de la propuesta que se presenta a continuación.

Objetivo

El objetivo principal del programa es promover el bienestar de personas con demencia grave y de sus cuidadoras/es atendiendo a sus necesidades psicosociales, para lograr una mejora en su calidad de vida y satisfacción en las interacciones cotidianas, todo ello, mediante una intervención individualizada y sistémica que pretende enriquecer los entornos de cuidado. Este fin último se detalla en objetivos concretos dirigidos a la persona en sí, su familia y profesionales.

Objetivos específicos:

- Persona en fase avanzada de la demencia
 - Favorecer el confort, físico y psicológico, e intentar aliviar el malestar de distinto tipo, si hubiese.
 - Promover las oportunidades de interacción y la comunicación entre la persona y su entorno social.
 - Aumentar la estimulación y la conexión con su biografía y el medio, de manera personalizada y adaptada.
 - Promover la individualización de la atención y la adecuación a su historia vital, necesidades, capacidades y preferencias.
 - Dotar de mayor visibilidad a las personas con demencias avanzadas y favorecer su identidad e inclusión social.

- Familias
 - Introducir la visión de fragilidad de la persona mayor y el enfoque paliativo de atención como marco de los cuidados.
 - Evaluar el ajuste a la situación y la vivencia personal del/a familiar, y ofrecer apoyo psicológico si lo precisase.
 - Crear una oportunidad para la planificación anticipada de la atención.
 - Aumentar la satisfacción con los cuidados del centro y su adaptabilidad a la situación de la persona con demencia.
- Profesionales
 - Mejorar la *capacitación para acompañar a personas con demencias avanzadas*, invitándoles a conocer su recorrido vital más allá de la enfermedad, y dándoles herramientas útiles y adaptadas para lograrlo. En definitiva, se trata de dirigir la mirada a la persona en su integralidad e unicidad, y no solo a la enfermedad manifiesta.
 - Aumentar la *consciencia de las necesidades psicosociales* de las personas con demencia y el *compromiso con la atención integral*.
 - Incrementar la *satisfacción profesional* por la adecuación de los cuidados a las necesidades de la persona.

Contenidos

El programa se materializa dentro de un proceso de implantación de varias fases y participan desde el inicio residentes, familiares y profesionales. El núcleo de la iniciativa es una intervención grupal y estructurada de corte sensorial que sirve para testear los cuidados adaptados a las necesidades de personas con demencias avanzadas. Posteriormente se persigue extender los resultados y las interacciones al día a día del entorno residencial para enriquecer las actividades diarias y relaciones entre persona con demencia y profesionales-familias.

Las fases que se han puesto en marcha para desarrollar el programa se especifican a continuación:

- 0. Selección de los centros participantes y presentación del programa a la organización.
- 1. Identificación de residentes en base a criterios de inclusión y exclusión.
- 2. Entrevista con las familias para abordar vivencia de la situación de deterioro, promover la planificación compartida de la atención y recoger la *Historia de Vida-Biografía Sensorial* de la persona mayor.
- 3. Recogida de información de profesionales referentes (CAVIDA- QUALID).
- 4. Planificación y ejecución de una intervención semanal grupal de estimulación sensorial y verbal y registro sistemático.
- 5. Incorporación de personal auxiliar/gerocultor a las sesiones, entrenamiento y feedback.
- 6. Invitación a familiares para participar en las sesiones, seguimiento de la intervención y feedback.
- 7. Evaluación de los resultados de la intervención: reacciones en residentes y participación y satisfacción de familias y profesionales (Fase actual).

- 8. Integración de la experiencia en el funcionamiento diario del centro (No ejecutado aún).

Metodología

Se desarrolla una intervención semanal de una hora, en formato grupal pequeño, pero personalizado. Las sesiones se basan en la estimulación multisensorial y emocional, mediante actividades adaptadas a la biografía y necesidades psicosociales de la persona y a la fase de la demencia. Las/os profesionales que llevan a cabo la intervención son dos psicólogas y auxiliares de enfermería/personal gerocultor, quienes deben conocer la singularidad de cada persona para adaptarse a sus necesidades y estado.

Las personas destinatarias del programa son residentes con demencias avanzadas en *estadios GDS 6-7* y que cumplen con criterios de *fragilidad avanzada (NECPAL +)*. Esto implica puntuaciones MEC de 0-12 en la valoración cognitiva, dificultades significativas en la comunicación verbal, y a nivel funcional, dependencia grave - dependencia total para las actividades diarias. Se establece en 8 el número máximo de personas participantes para el buen desarrollo de la intervención.

La personalización y la adaptación al estado de las personas residentes son clave para el desarrollo de las sesiones. Por un lado, se recoge la *Historia de Vida y Biografía Sensorial* a través de una entrevista con las familias. A esta información se le añade la recogida a través del/a profesional referente por medio de la *Escala de Calidad de vida en Demencia Avanzada (CAVIDA-QUALID)*. Asimismo, se elabora un *registro de análisis sensorial individualizado* que se completa tras cada sesión.

En el *desarrollo de las sesiones* es indispensable la creación de un clima de confort teniendo en cuenta necesidades básicas cubiertas, sin ruidos, luz tenue, respetar espacio y tiempo de sesión... Cada intervención consta de *cuatro partes*. Primero, se realiza la bienvenida cálida al espacio físico mediante el control de estímulos ambientales y un chequeo del confort de la persona. Posteriormente, se ofrece tiempo de relajación y se prosigue generando un ambiente de bienestar con actividades como acicalarse, masajear las manos, dar la mano, hablar sobre la información de su Historia de Vida, ofrecer comida, bebida... Luego, se desarrollan acciones de estimulación adaptadas y personalizadas gracias a la información recogida, como escuchar música preferida, facilitar objetos variados según sentidos, jugar, ofrecer estímulos significativos... Finalmente, se realiza un cierre informado y acompasado.

Resultados

Se ha realizado una evaluación cuantitativa de la participación de residentes, profesionales y familias en el programa y se está desarrollando una recogida de feedback de familias y profesionales pendiente de análisis. No obstante, debido a la singularidad de cada centro, se trata de datos preliminares por encontrarse estos en fases diferentes de la implantación del programa.

El alcance de la intervención hasta la fecha es de 36 personas residentes, 35 familias, 62 profesionales y 2 personas voluntarias, constatándose una buena adherencia a la misma y reportando un alto grado de satisfacción generalizado. La valoración positiva de esta iniciativa se refleja en todas las personas participantes de diferente manera:

- En cuanto a las personas con demencia avanzada, se evidencian reacciones de bienestar significativas durante las sesiones, como incremento de la reactividad y conexión con el entorno, relajación de la expresión facial, mayor interés e intención comunicativa verbal y no verbal, manifestaciones emocionales más variadas e intensas, y alivio del disconfort en ocasiones.
- Respecto al personal auxiliar/gerocultor, se ha elaborado un cuestionario breve de tres ítems para conocer las reflexiones y las emociones que ha generado su participación, así como la utilidad en el acompañamiento y atención a la persona con demencia. Actualmente se han recogido 36 cuestionarios y se están analizando estas devoluciones, expresándose una mayor satisfacción, así como un mayor conocimiento de la propia persona a través de su Historia de Vida. Esto implica cuidar y atender con presencia plena centrándose en las necesidades individuales de la persona.
- Las familias manifiestan interés por la evolución de las sesiones en las conversaciones y llamadas de seguimiento realizadas y satisfacción por las reacciones de sus familiares. Actualmente se han recogido 9 cuestionarios tras su participación en las sesiones, pero tal y como se ha dicho anteriormente, han verbalizado valoraciones positivas al equipo, lo que repercute en beneficio de su implicación en el programa.

En resumen, se dispone de evidencias cuantitativas y cualitativas preliminares de que el programa impacta positivamente en todas las personas implicadas, residentes, familias y profesionales, lo que incrementa el compromiso de los centros participantes con el avance de su implementación. De esta manera, actualmente se están valorando alternativas para integrar la experiencia en la cotidianeidad de espacios, interacciones y actividades de las residencias.

Autores

- Zuazua Romero, Legendika
- Cuevas Parra, Amaya
- García Letamendi, Marijo
- Ramon Ochoa, Janire
- Bilbao Larrabaster, Markel



Zahartzaroa

Zahartzaroa
Asociación vasca de geriatría y gerontología

Calle Goiru 1, 4ºplanta
20500 Arrasate-Mondragón
604 548 070

www.zahartzaroa.org